



وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

استوب فالي

المادة الفعالة:

بيندامتالين 33% اي سي Pendimethalin 33% EC

خواص المبيد:

مبيد أعشاب اختياري ويستخدم قبل الإنبات لمكافحة نمو بذور الحشائش الحولية رفيعة وعريضة الأوراق، كما يمكن مكافحة الحشائش وهي صغيرة في طور البادرات (1 - 1.5) ورقة للحشائش الحولية الرفيعة و(2-3) أوراق للحشائش العريضة.

معدل وطريقة الإستعمال:

اسم المحصول	المعدل الاستخدام	الاعشاب	ملاحظات	فترة التحريم
القمح والشعير	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار	الأعشاب (الحشائش) الرفيعة: أبو ركة (ذنبية)، ثمام، هيمان، لزيق، حليان، دفرة، سميحا، عقرش، وأبيرا.	يستخدم في الأراضي الثقيلة: قبل الإنبات، وفي الأراضي الرملية: مباشرة بعد الإنبات، بحيث لا يتعدى نمو الحشائش عن 1.5 - 2 ورقة والبذور بعمق 3-5 سم	21 يوم
البرسيم	3 - 4.5 لتر/ هكتار	الأعشاب (الحشائش) الرفيعة: أبو ركة (ذنبية)، ثمام، هيمان، لزيق، حليان، دفرة، سميحا، عقرش، وأبيرا.	يستخدم بعد الإنبات بعد بلوغ المحصول مرحلة 3 ورقات حقيقة، بعد الحش ويجب تفادي الرش أثناء ساعات النهار الحار.	21 يوم
البطاطس	3.8 - 6 لتر/ هكتار	الأعشاب (الحشائش) العريضة: قطيفة (عرف الديك)، عين القط، أتريلكس، كيس الراعي	يستخدم قبل 7 أيام من إنبات محصول البطاطس وأفضل وقت مباشرة بعد عملية التريدم.	21 يوم
البصل، الثوم الكرات	3.8 - 5.3 لتر/ هكتار	كاردمينا، الزريخ، أم اللين، شترج، رمرام، جاليوم، لسان الحمر، قرطاب،	يستخدم قبل الإنبات وفي خلال 4 أيام من الزراعة وتعمق البذور إلى 3 سم. أو بعد الإنبات أو الشتل وبعد وصول النبات إلى طور ورقة كاملة ويمكن إعادة المعاملة بعد 60 يوم.	21 يوم
الخضار	3 - 6 لتر/ هكتار	الرجلة (صغيرة)، الخردل البري، الحراقة واللويش.	قبل نقل الاشتال	21 يوم
الجزر	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار	الرجلة (صغيرة)، الخردل البري، الحراقة واللويش.	قبل وبعد الإنبات، البذر بعمق 3 سم	21 يوم
بساتين الفاكهة والعنب	3 - 6 لتر/ هكتار		برش المبيد قبل ظهور البراعم وفي حال وجود أعشاب نامية تحت الأشجار.	—

