



وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH

سوبر كلير

المادة الفعالة:

Metribuzin 75%

ميتروبيوزين 75%

خواص المبيد:

ميتريبيوزين مبيد عشبي جهازى اختياري يستعمل على البطاطس قبل الإنبات وبعده ويستخدم على الطماطم المزروع بالشتل في الحقول المفتوحة فقط والبرسيم لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميطا (Poa anna) وللحصول على توزيع جيد للمبيد في منطقة الجذور يجب أن تكون التربة رطبة وأيضاً يجب أن تكون الطبقة السطحية للتربة محدثة جيداً.

معدل وطريقة الإستعمال:

المحصول	الوقت	نوع التربة	معدل الاستخدام	التحريم
البطاطس: يتم الرش مرة واحدة فقط خلال الموسم، يجب ألا يزيد طول الأعشاب عند مكافحة عن 2.5 سم	قبل الانبات	خفيفة	0.70 - 0.47 كجم/هكتار	60 يوم
		متوسطة ثقيلة	0.93 - 0.70 كجم/هكتار	
		خفيفة متوسطة ثقيلة	0.47 كجم/هكتار	
البطاطس	بعد إنبات البطاطس وحتى ارتفاع البطاطس سم وعند تخطي هذا الطول يحدث ضرر للنبات			
الطماطم في الحقل	بعد حوالي عشرة أيام من غرس الشتلات		0.47 كجم/هكتار	42 يوم
البرسيم	في السنة الثانية من عمر المحصول وخلال طور السكون ويستعمل فقط على البرسيم المزروع كعلف وليس على البرسيم المزروع للبذار		0.70 - 0.47 كجم/هكتار	38 يوم
الأعشاب: الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميطا				

