

مبيدات الأعشاب

استوب فالي



■ المادة الفعالة:

بيندامثلين 33% Pendimethalin 33%

■ خواص المبيد:

مبيد أعشاب اختياري ويستخدم قبل الإنبات لمكافحة نمو بذور الحشائش الحولية رفيعة وعريضة الأوراق كما يمكن مكافحة الحشائش وهي صغيرة في طور البادرات (1-1.5) ورقة للحشائش الحولية الرفيعة و (2-3) أوراق للحشائش العريضة.

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	معدل الإستخدام	الأعشاب	ملاحظات	فترة التحريم
القمح والشعير	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار	الأعشاب (الحشائش) الرفيعة أبو ركة (دنيبة) ثمام - هيبان - لزيق - حلبان - دفرة - سميجا - عقرش - وأيبرا الأعشاب (الحشائش) العريضة قطيفة (عرف الديك) - عين القط أتربلكس - كيس الراعي كاردمين - الزربيع أم اللين - شترج - رمرام جاليوم - لسان الحمر قرطاب - الرجل (صغيرة) الخردل البري المراقبة واللويش	يستخدم في الأراضي الثقيلة قبل الإنبات. وفي الأراضي الرملية مباشرة بعد الإنبات، بحيث لا يتعدى نمو الحشائش عن 1.5 - 2 ورقة والبذور بعمق 3 - 5 سم	21 يوم
البرسيم	3 - 4.5 لتر/ هكتار		يستخدم بعد الإنبات بعد بلوغ المحصول مرحلة 3 ورقات حقيقة بعد الحش ويجب تفادي الرش أثناء ساعات النهار الحار.	21 يوم
البطاطس	3.8 - 6 لتر/ هكتار		يستخدم قبل 7 أيام من إنبات محصول البطاطس وأفضل وقت مباشرة بعد عملية التريدم.	21 يوم
البصل - الثوم الكرات	3.8 - 5.3 لتر/ هكتار		يستخدم قبل الإنبات وفي خلال 4 أيام من الزراعة وتعمق البذور إلى 3 سم. أو بعد الإنبات أو الشتل وبعد وصول النبات إلى طور ورقة كاملة ويمكن إعادة المعاملة بعد 60 يوم	21 يوم
الخضار	3 - 6 لتر/ هكتار		قبل نقل الاشتال	21 يوم
الجزر	3.8 - 4.5 لتر/ هكتار		قبل وبعد الإنبات البذر بعمق 3 سم	21 يوم
بساتين الفاكهة والعنب	3 - 6 لتر/ هكتار		يرش المبيد قبل ظهور البراعم وفي حال وجود أعشاب نامية تحت الاشجار.	—

