

مبيدات الأعشاب



وادي الصفوة الزراعية
WADI ALSAFOH



اميزاللايت

■ المادة الفعالة:

امازيثاابير 70% Imazethapyr 70%

■ خواص المبيد:

طريقة عمل المبيد تعتمد على طريقة الإمتصاص إما بواسطة جذور الحشائش أو الأوراق وتمتص بسرعة للقمم النامية. يجب توفر الرطوبة المناسبة لفعالية المبيد القصوى. الحشائش الحساسة للمبيد تتوقف عن النمو وتموت وعلى أقل تقدير لا تنافس المحصول. يكافح معظم الحشائش العريضة والرفيعة النابتة عند استخدامه بعد الإنبات

■ استخدام المبيد :

مبيد جهازى يستخدم للمكافحة الفعالة لمعظم الحشائش الرفيعة والأعشاب العريضة عند ظهور الورقة الثانية للبرسيم حديث النمو فالنبات يظهر مقاومة عالية للمبيد عند استخدامه بعد الإنبات يمكن أن يظهر اصفرار خفيف على الأوراق وانخفاض في طول النبات حالا بعد الرش على النبات وهذا التأثير وقتي وسرعان ما يعود البرسيم للنمو الطبيعي. يمكن استخدامه للبرسيم المزروع في الشتاء أو الربيع إلى فترة الركود أو شبه الركود أو بين فترات الحصاد. يجب استخدام المبيد عندما يكون البرسيم أقل من 7,5 سم حتى يتمكن المبيد من الوصول للحشائش

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	مرحلة النمو	معدل الإستخدام	فترة التحريم
البرسيم المزروع حديثاً	عندما تكون بادارت البرسيم في طور (2-3) أوراق	107 جم/ هكتار	30 يوم
البرسيم المزروع من قبل	قبل بداية النمو الربيعي عندما يتعدى البرسيم فترة الركود أو بعد الحش	142 جم/ هكتار	30 يوم



www.alsafoah.com.sa



walsafoah@gmail.com