

مبيدات الأعشاب

برولايت

■ المادة الفعالة:

Flumetsulam 80%

فلوميتسولام 80%



■ خواص المبيد:

برولايت عبارة عن مبيد أعشاب اختياري للاستخدام في مكافحة مجموعة من الأعشاب عريضة الأوراق بعد انباتها في محصول القمح والبرسيم يقوم برولايت بتثبيط تكون الأحماض الأمينية الضرورية لنمو جذور وسيقان الأعشاب تبدأ أعراض المكافحة 5 - 7 ايام للأعشاب الحساسة وتموت الأعشاب بعد 14-21 يوم أما الأعشاب الأقل حساسية لا تموت ولكن تتقزم وتبقى متقزمة بشدة

معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال	فترة التحريم
البرسيم	الخبيزة الطرطير (الذريخ) - الجرجير - الفجل البري - الحميض - الخردل البري - الشلياط (الصليح) - الرجل	يستخدم المبيد بعد الانبات عندما تكون الأعشاب 2-3 ورقات بمعدل 35 - 40 غم/ هكتار الرجلة يؤثر عليها بطريقة متفاوتة حسب تركيز ووقت رش المبيد لكن للحصول على أفضل النتائج ينصح الرش بتركيز 40غم/ هكتار عندما تكون الرجل في طور ورقتين	28 يوم
القمح	الخبيزة - الطرطير - الجرجير - الفجل البري الحميض - الخردل البري الشلياط (الصليح)	الاستخدام بعد الانبات عندما تكون الأعشاب 3-8 ورقات بمعدل 25-40 جم/ هكتار ويستخدم للهكتار 150 - 250 لتر ماء بواسطة مرشة الاجنحة المعيرة جيدا	28 يوم

