

مبيدات الأعشاب

سوبر كلير



■ المادة الفعالة:

ميتروبيوزين 75% Metribuzin 75%

■ خواص المبيد:

ميتروبيوزين مبيد عشبي جهازى اختياري يستعمل على البطاطس قبل الإنبات وبعده ويستخدم على الطماطم المزروع بالشتل في الحقول المفتوحة فقط والبرسيم لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميحا (Poa anna) وللحصول على توزيع جيد للمبيد في منطقة الجذور يجب أن تكون التربة رطبة وأيضاً يجب أن تكون الطبقة السطحية للتربة محروثة جيداً



معدل وطريقة الإستعمال

المحصول	الوقت	نوع التربة	معدل الإستخدام	فترة التحريم
البطاطس: يتم الرش مرة واحدة فقط خلال الموسم، يجب ألا يزيد طول الأعشاب عند مكافحة عن 2.5 سم	قبل الانبات	خفيفة	0.47 - 0.70 كجم/ هكتار	60 يوم
		متوسطة - ثقيلة	0.70 - 0.93 كجم/هكتار	
		خفيفة متوسطة - ثقيلة	0.47 كجم/ هكتار	
البطاطس	بعد إنبات البطاطس وحتى ارتفاع البطاطس سم وعندخطي هذا الطول يحدث ضرر للنبات			
الطماطم في الحقل	بعد حوالي عشرة أيام من غرس الشتلات		0.47 كجم/ هكتار	42 يوم
البرسيم	في السنة الثانية من عمر المحصول وخلال طور السكون ويستعمل فقط على البرسيم المزروع كعلف وليس على البرسيم المزروع للبدار		0.47 - 0.70 كجم/ هكتار	38 يوم

الأعشاب الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميحا



www.alsafoah.com.sa



walsafoah@gmail.com